Polish

Nieprawidłowe wyniki wymazu z szyjki macicy

Czym jest wymaz z szyjki macicy?

Wymaz z szyjki macicy jest szybkim i prostym badaniem pozwalającym wykryć ewentualne zmiany chorobowe w komórkach szyjki macicy pacjentki. Wczesne wykrycie takich zmian i rozpoczęcie leczenia w 90% procentach przypadków pozwala zapobiec rozwojowi raka szyjki macicy.

Co oznacza niezadowalający wynik wymazu z szyjki macicy?

Niezadowalający wynik wymazu z szyjki macicy oznacza, że pracownicy laboratorium nie byli w stanie wystarczająco dobrze zobaczyć komórek wymazu, aby móc poddać je ocenie. W takim przypadku lekarz może zalecić powtórzenie badania. Nie jest to powód do żadnych obaw.

Niekiedy wymaz z szyjki macicy może wykazać oznaki stanu zapalnego. Jeżeli poza tym wynik testu był prawidłowy, pacjentka zostanie poproszona o powtórzenie badania za dwa lata.

Co oznacza nieprawidłowy wynik wymazu z szyjki macicy?

Nieprawidłowy wynik wymazu oznacza, że niektóre komórki szyjki macicy odbiegają nieco od normy. Zdarza się tak w przypadku 1 na 15 wykonanych badań. Nieprawidłowy wynik bardzo rzadko jest równoznaczny z rakiem szyjki macicy, a nieprawidłowości mogą być konsekwencją wielu innych czynników.

Rodzaje nieprawidłowości

Nieprawidłowości można podzielić na nieprawidło wości niskiego i wysokiego stopnia.

Nieprawidłowości niskiego stopnia

Są to niewielkie zmiany, które zazwyczaj ustępują z czasem. Większość nieprawidłowości niskiego stopnia jest efektem infekcji spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Wirus ten jest bardzo powszechny i 4 na 5 kobiet ma z nim styczność w swoim życiu. Większość kobiet zainfekowanych wirusem HPV nie zapada na raka szyjki macicy.

Wirus HPV jest przenoszony przez kontakt skóry z okolic genitalnych. Zazwyczaj organizm niszczy aktywnego wirusa w sposób naturalny w ciągu 1-2 lat. Jeżeli pewne typy wirusa HPV utrzymują się przez kilka lat, ryzyko rozwoju raka szyjki macicy wzrasta.

Leczenie nieprawidłowości niskiego stopnia

Jeżeli wyniki poprzednich badań były prawidłowe, lekarz zaleci następne badanie za rok. W tym czasie organizm będzie miał okazję samoistnie zwalczyć infekcję spowodowaną przez wirus HPV, a nieprawidłowości będą mogły ustąpić.

W przypadku, gdy wynik ponownego badania będzie nieprawidłowy, pacjentka zostanie skierowana do specjalisty na kolposkopię. Badanie to polega na umieszczeniu przez pochwę wziernika, który pozwala lekarzowi zobaczyć powiększony obraz szyjki macicy i sprawdzić naturę wykrytych nieprawidłowości.

Verte

The Cancer Council Victoria
1 Rathdowne St
Carlton Vic 3053
Australia
Telephone: (03) 9635 5000
Facsimile: (03) 9635 5360
Email: papscreen@cancervic.org.au
Internet: www.papscreen.org.au
PapScreen Victoria

Niektóre kobiety, u których stwierdzono nieprawidłowości niskiego stopnia mogą być skierowane bezpośrednio na kolposkopię bez konieczności powtarzania wymazu z szyjki macicy.

Nieprawidłowości wysokiego stopnia

Nieprawidłowości wysokiego stopnia to poważniejsze zmiany komórek szyjki macicy, które nie leczone mogą łatwiej przekształcać się w raka szyjki macicy. Proces ten trwa zazwyczaj do dziesięciu lat.

Leczenie nieprawidłowości wysokiego stopnia

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wysokiego stopnia lekarz ogólny kieruje pacjentów do specjalisty w celu wykonania kolposkopii. W trakcie tego badania może zostać pobrany mały wycinek tkanki do badań laboratoryjnych (biopsja).

Istnieje wiele opcji leczenia, w zależności od tego, jak poważne są zmiany. Różne są też metody usuwania chorobowo zmienionej tkanki szyjki macicy, a większość z nich wymaga tylko jednodniowego pobytu w szpitalu.

Aby zasięgnąć bliższych informacji na temat wyników wymazu z szyjki macicy i możliwych nieprawidłowości lub zamówić broszurę Wyniki wymazu z szyjki macicy – opis nieprawidłowości, skontaktuj się z infolinią Wiktoriańskiej Rady ds. Chorób Nowotworowych pod numerem 13 11 20 lub odwiedź stronę www.papscreen.org.au.

W celu uzyskania bliższych informacji w języku polskim prosimy telefonować pod numer 03 9209 0165.

An English version of this fact sheet can be found at www.papscreen.org.au